n.° 271.

Observation sur une tumeur des plus considerable, eû egard à la partie faite par un déspôst critique, situé sur le sommet de la teste occupant presque toute l'etandüe du cuir cheuelu;

Le huit may 1742. Estant à la ferté vidame pays du perche, l'on m'y amena un malade de marchainuille distant d'une lieux, âgé de 28. ans, tres mauuaist sujet par luy meme et foible de temperament, estant scrophuleux depuis son enfance, ayant toujours eû une trainnée, ou plustost un demit collier de glandes engorgées depuis l'angle de la machoire inferieure sous le petit lôbe de l'oreille du côté droit, jusqu'à la partie laterralle du larinx du meme côté, comme aussi les glandes des aiselles et celles des aînes; lequel depuis un mois etoit attaqué d'une fieure viollante continüe maligne à laquelle ensuite il est suruenût une inflamation, et engorgement à la glande parotide du côté gauche, lequel engorgement, à disparut ainsi que la fieure maligne, dans les 24 heures, par un metastaze, ou transport

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 48 n°122

De cette meme humeur, pour former un despost —
Bien plus Considerable, dans toutes Letandüe des —
parties Superieures de La teste, sous Les tegumens, —
ou Cuir Cheuelu; occupant Les deux parietaux
Se Continuant ensuite Lateravallement de chaque Côté, jusqu'à Là
partie moyenne des deux temporeaux; —
anterieurement tout Le frontal, jusqu'à Sa partie
moyenne dessandant. Ensuite, et formant une —
fusée Entre Loreille, et Le petit angle de Loeil —
du Côté gauche, se Continuant Jusque Sur —
Lapophise Zigomatique et posterieurement
toute Letandüe de Loccipital, Jusqu'à la partie
moyenne, Lequel despost formoit en total, —
une tumeur Si Considerable, que Lon auroit —
put La prendre pour une Seconde teste antée —
Sur La premiére; auec une vraie fluctuation
Si manifeste et Comme d'elle meme, au moindre
mouuement dans toute Son Etandüe, ou En jmposer, Comme —
Sil n'y auoit plus Eû de Substance dans la teste meme,
Il n'y auoit que huit jours que Ce despost estoit
formé quand je Le vit pour La premiere foy, —
neanmoins il y en auoit plus de six qu'il etoit
En Etat d'estre opperé, Ce qui auoit tellement —
Eminceé Les tegumens qu'ils estoient presque —
totallement destruis, fondûs, et mortifiez, —
Se trouuant dans toute Leurs etandüe d'une —

Couleur noiratre, et prést à Sentamer Dans toutes
Leurs parties, Sans presqu'aucunes apparance
de vie, et par consequant Sans esperance de
pouuoir Les Conseruer; neanmoins apres auoir
Examiné et reflechit auec attention Sur L'Etandüe
prodigieuse de La tumeure, et Le mauuais etat
des tegumens, La premiere idée qui Se presantoit
D'abord, estoit d'en faire L'ouuerture Dans toute
Son Etandüe, mais reflechissant de nouueau
Sur Leffet de La Destruction total des tegumens
que j'auois eté obligé de faire en les Emportant
Dans L'operation; maneuvre qui auvoit mis
presque toute La teste du malade à Descouvert,
Ce qui par conséquant auvoit fait vne playe
d'une Etandüe aussi prodigieusement grande
que Douloureuse dans Chaque pancemens,
Et qui auvoit put faire perir Le malade, Eu
Egard à Sa grande foiblesse, Supposé meme
pour vn moment que Le malade eust Eu assée
de force et de jeunesse pour y resister, Cela
auvoit fait aumoins vne Cure d'une tres
Longue attente, auec des Douleurs Extrémes
par les jmpressions de Lair à toutes Les fois
que j'auvois eté obligé de Le pancer; Enfin
toutes reflections faite, et toutes difficultées
Calculées; Je me Suis Determiné à ménager

Les tegumens, Dans Lésperance que pour peu quils
Eussent encore ~~[illegible]~~ de vie, que je pouvoist aprés
Leuacuation du pûs, Les Raprocher, et Recoller,
ou Reunir, jnsensiblement au tout, et Cela par
Le moyen des Compresses Expulsiues, jmbibées
des Remédes Ranimant, fortifiant, et Resolutifs,
Secondées d'un Bandage approprié aux parties,
Et Reunissant;
Ce Dessein formé il ne me Restoit donc plus
que d'examiner auec Circonspection, et
attention, Les Endroits Essentiels, et Les plus
Declives ou je deuois faire mes jncisions,
pour et afin de donner plus de facilité et de
pante, á Leuacuation total du pus, afin de
mettre pour ainsi-dire toute La tumeur á Séc
autant quil etoit possible pour trauailler
Ensuite auec moins de difficultés á Remplir
mon jntention; Je fist donc La premiere
jncision á La partie posterieure de la tumeur,
de La Longeure de deux Bons trauers de doigts,
C'est á dire á La partie moyenne Inferieure
de Loccipital, par laquelle Le pûs sorty auec
jmpetuosité; Dans Le meme jnstant je fist
appliquer Dessus Louuerture une Compresse
fort Epaisse, Soutenüe par La main d'un
Seruiteur, pour en Empescher Leuacuation,

afin de me faciliter Les autres incisions qui Etoient
necessaire; Je pratiqué La seconde Sur le Zigomatique
gauche de La meme Etandue de La premiere, par laquelle
Le pûs sorty auec La meme impetuosité, Je fit —
observer à Cette seconde, La meme maneuvre qu'a —
La premiere, afin de pouuoir faire La troisieme —
auec Le meme auantage, que je pratiqué à la partie
moyenne et Laterale du Coronal du Coté Droit —
par laquelle Le pus sorty auec la meme abondance,
que je Laissé Couller ensuitte tant quil put s'en —
presanter, en Le Recevant dans un Bassin apres —
quoy, J'osté Le point D'apuit dont je m'estoit servit
sur Les deux premieres incisions, L'un apres L'autre
afin de Recevoir tout Le pûs dans Le meme —
Bassin, j'en tiray Cinq Demistiers mesure de
paris, tres Limpide, et sereux tirant sur Le Jeaune,
Et tres puant, apres quoy J'exprimé Legerement
auec un Linge toute L'etendüe de la tumeur, pour —
La Rendre à seic; J'appliqué Ensuitte de La Charpie
Brutte sur Chaque incisions, Et je Raplique —
autant quïl me fut possible Les tegumens sur —
Le tout, en Les Rassemblant, et Rattatinant pour —
ainsi dire sur eux memes, malgré tous Leurs —
plis et Replis, formant pour Lors Comme une
Besasse vide, et par dessus je posé Les Compresses —
Expulsiues, Le plus artistement quil me fut —
possible, trampées Dans Les fortifiants, et Resolutifs

Et Ensuite Le Bandage approprié, et tendant à Remplir —
mon jntention; Je prescrivit un Regime Conuenable
au malade et Le Saigné quatre heures après Loperation,
Comme aussi Le Landemain matin; vingt quatre —
heures après, je Leuez Le premier appareil, il en —
Sortit encore deux Bons vers depuis, par Lexpression
douce que jen fist de toutes parts, en Bien mennageant
Les tegumens, japliqué sur Les jncisions des —
plumaceaux Chargés d'un digestif, et je Continué —
Les Compresses Expulsiues trampées dans Les —
Remedes fortifiants, et Resolutifs, auec Le Bandage
Comme Cy dessus, Le Surlendemain et dans Le —
Second pancement, je mapperceut que Les tegumens —
Commencoient à me donner quelqu'esperance —
de Les faires Reuiure, en me flattant d'un Bon —
Succes, il en sorty encore un Bon demit verre de
plus, et D'une Consistance tres Loüable, Le 3.e jour, —
Le pancement se trouua presqu'a Sec, et je trouué
auec grande Satisfaction, Les tegumens Rassemblés
Sur eux mesme, Les plis et Replis presque —
totallement Effacés, et Reunis en plusieurs points, —
Lesquels je mennagéz auec grande attention, —
Ce qui me fit esperer que Le malade seroit —
Bientost guerit d'une grande maladie, et auec —
tres peu de douleurs, pour ne pas dire point du tout,
Eû Egard à Celles quil auroit Souffert, Si Les tegumens —
auoient Eté Destruist, Enfin Le quatrieme jour, —

Le Reste des plis, et Replis des tegumens se trouva
Effacé dans toute Leurs etandües, et Reunis à peu —
près dans tous Leurs points, avec très peu de Supuration
Le Cinquième jour La Reunion en fût totallement —
faite, n'y ayant plus que les trois jncisions En —
Supuration, Les quelles furent parfaitement —
Cicatrisées Le quizième jour, et le malade très —
Bien guerit, notté que je purgé Le malade trois —
fois dans Les Six derniers jours avec les fondans. —
il est Bon d'observer que toutes les glandes —
Serophuleuses, et Engorgées, dont j'ay fait mention
Cy devant Ce sont trouvées totallement fondües, —
Et par conséquant guerres, n'y paroissant —
nullement, et Le malade ayant pour ainsi —
dire Changé de temperament, s'estant toujours —
Bien porté depuis, estant devenu fort et —
vigoureux, Ce qu'il n'avoit jamais été —
L'ayant vüe dans cet Etat de force plus de —
Dix ans après;

Bouvier.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE